



Notice d'emploi N° 7039 / 2019

Pour les produits phytosanitaires visés à l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916.161)

Caractéristiques du produit

Dénomination spécifique:	Désinfectant des semences, Fongicide
Formulation:	ES emulsion pour traitement des semences
Teneur en substances actives:	30.9 % métalaxyle-M (339.2 g/l)
Nom UICPA:	methyl N-(methocycetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Stockage

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Elimination

Emballage:	Les récipients vides, nettoyés avec soin, doivent être confiés à la voirie pour leur élimination.
Restes de produits phytosanitaires:	Les restes de produits phytosanitaires doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Produits commerciaux

Indications autorisées

Domaine d'application	Ravageur	Spécifications d'application	(*)
Culture maraîchère			
Baby-Leaf (Asteraceae)	Pythium spp.	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences Délai d'attente: 4 Semaine(s)	1, 2, 3, 4
ail, échalote, oignon	Pythium spp.	Dosage: 0.05 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
aubergine	mildiou de l'aubergine, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosage: 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
bette, betterave à salade, épinard	mildiou de l'épinard	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
carotte	Pythium spp.	Dosage: 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
choux	Pythium spp.	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
courgette	Pythium spp.	Dosage: 0.1 - 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
fines herbes	mildious des fines herbes, Pythium spp.	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences Délai d'attente: 7 Semaine(s)	1, 2, 3, 4
melons	Pythium spp.	Dosage: 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
mâche, rampon	mildiou de la mache, Pythium spp.	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences Délai d'attente: 4 Semaine(s)	1, 2, 3, 4
poivron	mildiou du poivron, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosage: 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
radis de tous les mois	mildiou des crucifères	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
salades (Asteraceae)	Pythium spp.	Dosage: 0.2 l/100 kg de semences Délai d'attente: 4 Semaine(s)	1, 2, 3, 4

tomate	Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosage: 0.1 l/100 kg de semences	1, 2, 3, 4
épinard	Pythium spp.	Dosage: 0.05 l/100 kg de semences	1, 2, 3
Grande culture			
Tournesol	mildiou du tournesol	Dosage: 0.3 l/100 kg de semences	1, 2, 3

Charges générales / agronomiques:

- Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés par une étiquette portant l'inscription suivante:
 - Traité avec un désinfectant des semences. Ne pas ingérer! Il est interdit d'utiliser les restes de semences désinfectées comme fourrage ou pour l'alimentation, même après les avoir lavés.
 - Le nom, les substances actives et les phrases types pour les précautions en matière de sécurité du produit désinfectant des semences.
- Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).

Protection des utilisateurs:

- Lors de la désinfection des semences: Porter des gants de protection + un vêtement de protection + des lunettes de protection .
- Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés par une étiquette portant l'inscription suivante: "Lors de l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du semoir, porter des gants de protection. Éviter la formation et l'inhalation de poussières."

Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:

Phrases PPS

- Tenir hors de portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.