



# Notice d'emploi N° 8108 / 2019

Pour les produits phytosanitaires visés à l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916.161)

## Caractéristiques du produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dénomination spécifique:      | Herbicide  |
| Formulation:                  | EC concentré émulsifiable  |
| Teneur en substances actives: | 22.22 % clodinafop-propargyl (240 g/l); Safener: 5.55 % cloquintocet-mexyl (60 g/l)  |
| Nom UICPA:                    | prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propionate; 1-methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate |

## Stockage

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

## Elimination

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Emballage:                          | Les récipients vides, nettoyés avec soin, doivent être confiés à la voirie pour leur élimination.   |
| Restes de produits phytosanitaires: | Les restes de produits phytosanitaires doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente. |

## Produits commerciaux

### Brocar 240

Numéro d'homologation fédéral: F-6086

Pays d'origine: France

Numéro d'homologation étranger: 2120049

Titulaire de l'autorisation étranger: Bayer SAS, France

## Indications autorisées

| Domaine d'application                                | Ravageur                  | Spécifications d'application  | (*) |
|--|---------------------------|---|-----|
| <b>Grande culture</b>                                |                           |   |     |
| Blé d'automne, Épeautre, Seigle d'automne, Triticale | monocotylédones annuelles | Dosage: 0.25 - 0.35 l/ha<br>Application: post-levée., stade 13-30 (BBCH). | 1   |
| Blé de printemps                                     | monocotylédones annuelles | Dosage: 0.2 - 0.35 l/ha<br>Application: stade 13-30 (BBCH)., post-levée.  | 1   |

## Charges générales / agronomiques:

### Protection des utilisateurs:

- 1 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection.

## Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:

### Phrases PPS

Tenir hors de portée des enfants.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.