



Miscele di sementi per i contribuiti per i sistemi di produzione secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)

Strisce per organismi utili Composizione delle miscele di sementi 2024 (Invariato rispetto al 2023)

Miscela di sementi annuali che danno diritto ai contribuiti

| Miscela | Nome della specie italiano | Nome della specie latino | Quantità di sementi per ha in kg | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| Strisce per organismi utili VB annuali | Gittaione comune (CH) | <i>Agrostemma githago</i> | 0.40 | |
| | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> | 0.10 | |
| | Camomilla per tintori | <i>Anthemis tinctoria</i> | 0.07 | |
| | Borragine comune | <i>Borago officinalis</i> | 0.50 | |
| | Versione di base | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 0.38 |
| | | Coriandolo | <i>Coriandrum sativum</i> | 0.30 |
| | | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 8.00 |
| | | Costolina giuncolina (CH) | <i>Hypochaeris radicata</i> | 0.05 |
| | | Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.07 |
| | | Phacelia | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 1.75 |
| | | Reseda comune (CH) | <i>Reseda lutea</i> | 0.08 |
| | | Stregona annuale (CH) | <i>Stachys annua</i> | 0.05 |
| | | Trifoglio d'Alessandria | <i>Trifolium alexandrinum</i> | 0.70 |
| | | Trifoglio ibrido | <i>Trifolium hybridum</i> | 0.60 |
| | | Trifoglio incarnato | <i>Trifolium incarnatum</i> | 0.40 |
| | | Trifoglio pratense | <i>Trifolium pratense</i> | 0.20 |
| | | Trifoglio risupinato | <i>Trifolium resupinatum</i> | 0.40 |
| | | Strisce per organismi utili VI annuali | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> |
| Camomilla bastarda (CH) | | | <i>Anthemis arvensis</i> | 0.18 |
| Camomilla per tintori (CH) | | | <i>Anthemis tinctoria</i> | 0.05 |
| Versione integrale | | | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> |
| | Cicoria comune (CH) | | <i>Cichorium intybus</i> | 0.09 |
| | Coriandolo | | <i>Coriandrum sativum</i> | 0.36 |
| | Radicchiella capillare (CH) | | <i>Crepis capillaris</i> | 0.02 |
| | Grano saraceno comune | | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 7.29 |
| | Costolina giuncolina (CH) | | <i>Hypochaeris radicata</i> | 0.09 |
| | Ginestrino comune (CH) | | <i>Lotus corniculatus</i> | 0.09 |
| | Papavero comune (CH) | | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.09 |
| | Phacelia | | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 1.55 |
| | Reseda comune (CH) | | <i>Reseda lutea</i> | 0.14 |
| | Senape selvatica (CH) | | <i>Sinapis arvensis</i> | 0.36 |
| | Trifoglio d'Alessandria | | <i>Trifolium alexandrinum</i> | 0.05 |
| | Trifoglio ibrido | | <i>Trifolium hybridum</i> | 0.02 |
| | Trifoglio incarnato | | <i>Trifolium incarnatum</i> | 0.05 |
| | Trifoglio pratense | | <i>Trifolium pratense</i> | 0.04 |
| | Trifoglio risupinato | <i>Trifolium resupinatum</i> | 0.03 | |

| Miscela di sementi | Nome della specie italiano | Nome della specie latino | Quantità di sementi per ha in kg |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Strisce per organismi utili brassicacee annuali | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 4.10 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 11.00 |
| | Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.10 |
| | Veccia dolce | <i>Vicia sativa</i> | 44.80 |
| Per le colture di brassicacee | | | |
| Strisce per organismi utili CP annuali | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> | 0.24 |
| | Camomilla bastarda (CH) | <i>Anthemis arvensis</i> | 0.14 |
| | Cerfoglio comune | <i>Anthriscus cerefolium</i> | 0.28 |
| | Dorella coltivata (CH) | <i>Camelina sativa</i> | 0.09 |
| | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 0.72 |
| | Fiordaliso stoppione (CH) | <i>Centaurea jacea</i> | 0.10 |
| | Cicoria comune (CH) | <i>Cichorium intybus</i> | 0.05 |
| | Coriandolo | <i>Coriandrum sativum</i> | 1.30 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 10.80 |
| | Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.09 |
| | Reseda comune (CH) | <i>Reseda lutea</i> | 0.10 |
| | Silene aprentesi di notte (CH) | <i>Silene noctiflora</i> | 0.15 |
| Senape selvatica (CH) | <i>Sinapis arvensis</i> | 0.10 | |
| Strisce per organismi utili CA annuali | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> | 0.17 |
| | Camomilla bastarda (CH) | <i>Anthemis arvensis</i> | 0.12 |
| | Cerfoglio comune | <i>Anthriscus cerefolium</i> | 0.58 |
| | Dorella coltivata (CH) | <i>Camelina sativa</i> | 0.16 |
| | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 0.90 |
| | Fiordaliso stoppione (CH) | <i>Centaurea jacea</i> | 0.11 |
| | Coriandolo | <i>Coriandrum sativum</i> | 1.00 |
| | Radicchiella capillare (CH) | <i>Crepis capillaris</i> | 0.02 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 5.62 |
| | Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.11 |
| | Reseda comune (CH) | <i>Reseda lutea</i> | 0.10 |
| | Silene aprentesi di notte (CH) | <i>Silene noctiflora</i> | 0.14 |
| | Senape selvatica (CH) | <i>Sinapis arvensis</i> | 0.17 |
| Gallinella liscia (CH) | <i>Valerianella rimoso</i> | 0.11 | |

Osservazioni:

- Nelle Alpi centrali e sul versante sud delle Alpi¹ queste miscele non devono essere utilizzate (alterazione della flora autoctona)
- Le miscele vanno utilizzate nella zona di pianura e in quella collinare
- Vanno utilizzati ecotipi svizzeri (CH)

¹ UFAM (Ed.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Prima edizione 2001. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 pag.

| Miscela di sementi | Nome della specie italiano | Nome della specie latino | Quantità di sementi per ha in kg |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Strisce per organismi utili | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> | 0.50 |
| | Borragine comune | <i>Borago officinalis</i> | 1.00 |
| GR/TI/VS annuali | Coriandolo | <i>Coriandrum sativum</i> | 2.00 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 8.50 |
| Versione di base | Phacelia | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 1.60 |
| | Trifoglio d'Alessandria | <i>Trifolium alexandrinum</i> | 0.75 |
| | Trifoglio ibrido | <i>Trifolium hybridum</i> | 0.60 |
| | Trifoglio incarnato | <i>Trifolium incarnatum</i> | 0.40 |
| | Trifoglio risupinato | <i>Trifolium resupinatum</i> | 0.38 |

Osservazioni:

- Questa miscela è stata adeguata in base alle strisce per organismi utili versione di base da utilizzare nelle Alpi centrali e sul versante sud delle Alpi¹ e può essere impiegata nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese
- La miscela va utilizzata nella zona di pianura e in quella collinare

¹ UFAM (Ed.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Prima edizione 2001. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 pag.

Miscele di sementi pluriennali che danno diritto ai contributi

| Miscela di sementi | Nome della specie italiano | Nome della specie latino | Quantità di sementi per ha in kg |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Strisce per organismi utili | Millefoglio montano (CH) | <i>Achillea millefolium</i> | 0.012 |
| | Aneto | <i>Anethum graveolens</i> | 0.35 |
| SCA pluriennali | Camomilla per tintori (CH) | <i>Anthemis tinctoria</i> | 0.025 |
| | Borragine comune | <i>Borago officinalis</i> | 0.20 |
| Per le colture sulla superficie coltiva aperta | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 0.35 |
| | Fiordaliso stoppione (CH) | <i>Centaurea jacea</i> | 0.15 |
| | Cicoria comune (CH) | <i>Cichorium intybus</i> | 0.08 |
| | Coriandolo | <i>Coriandrum sativum</i> | 0.20 |
| | Carota selvatica (CH) | <i>Daucus carota</i> | 0.03 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 7.80 |
| | Finocchio comune | <i>Foeniculum vulgare</i> | 0.20 |
| | Ambretta comune (CH) | <i>Knautia arvensis</i> | 0.10 |
| | Cicerchia dei prati (CH) | <i>Lathyrus pratensis</i> | 0.10 |
| | Margherita comune (CH) | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 0.06 |
| | Ginestrino comune (CH) | <i>Lotus corniculatus</i> | 0.20 |
| | Malva moscata (CH) | <i>Malva moschata</i> | 0.015 |
| | Malva selvatica (CH) | <i>Malva sylvestris</i> | 0.02 |
| | Erba medica | <i>Medicago sativa</i> | 0.18 |
| | Meliloto bianco (CH) | <i>Melilotus albus</i> | 0.05 |
| | Meliloto comune (CH) | <i>Melilotus officinalis</i> | 0.05 |
| | Origano comune (CH) | <i>Origanum vulgare</i> | 0.02 |
| | Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.06 |
| | Reseda comune (CH) | <i>Reseda lutea</i> | 0.03 |
| | Salvia comune (CH) | <i>Salvia pratensis</i> | 0.05 |
| | Salvastrella minore (CH) | <i>Sanguisorba minor</i> | 0.07 |
| | Erba amara selvatica (CH) | <i>Tanacetum vulgare</i> | 0.002 |
| | Barba di becco comune orientale (CH) | <i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i> | 0.13 |
| | Trifoglio ibrido | <i>Trifolium hybridum</i> | 0.07 |
| | Trifoglio pratense | <i>Trifolium pratense</i> | 0.05 |
| | Trifoglio bianco | <i>Trifolium repens</i> | 0.16 |
| | Verbasco falso barbasso (CH) | <i>Verbascum densiflorum</i> | 0.015 |
| | Veccia dolce | <i>Vicia sativa</i> | 0.30 |
| Strisce per organismi utili viticoltura pluriennali | Cappellini delle praterie (CH) | <i>Agrostis capillaris</i> | 0.02 |
| | Paleo odoroso (CH) | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | 0.50 |
| | Forasacco eretto (CH) | <i>Bromus erectus</i> | 4.00 |
| | Covetta dei prati (CH) | <i>Cynosurus cristatus</i> | 0.50 |
| | Festuca di Westfalia (CH) | <i>Festuca guestfalica</i> | 0.70 |
| Per la viticoltura, le colture di bacche pluriennali e la permacultura | Millefoglio montano (CH) | <i>Achillea millefolium</i> | 0.08 |
| | Acino annuale (CH) | <i>Acinos arvensis</i> | 0.07 |
| | Camomilla per tintori (CH) | <i>Anthemis tinctoria</i> | 0.02 |
| | Pratolina comune (CH) | <i>Bellis perennis</i> | 0.03 |
| | Dorella coltivata (CH) | <i>Camelina sativa</i> | 0.20 |
| | Fiordaliso stoppione (CH) | <i>Centaurea jacea</i> | 0.55 |
| | Radicchiella capillare (CH) | <i>Crepis capillaris</i> | 0.07 |
| | Carota selvatica (CH) | <i>Daucus carota</i> | 0.12 |
| | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 5.00 |
| | Becco di gru comune (CH) | <i>Erodium cicutarium</i> | 0.25 |
| | Caglio bianco (CH) | <i>Galium mollugo</i> | 0.11 |
| | Costolina giuncolina (CH) | <i>Hypochaeris radicata</i> | 0.08 |
| | Ambretta comune (CH) | <i>Knautia arvensis</i> | 1.00 |
| | Dente di leone comune (CH) | <i>Leontodon hispidus</i> | 0.10 |
| | Margherita comune (CH) | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 0.15 |
| | Ginestrino comune (CH) | <i>Lotus corniculatus</i> | 1.00 |
| | Malva domestica (CH) | <i>Malva neglecta</i> | 0.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|------|
| Erba medica lupulina (CH) | <i>Medicago lupulina</i> | 0.50 |
| Lupinella comune (CH) | <i>Onobrychis viciifolia</i> | 1.50 |
| Origano comune (CH) | <i>Origanum vulgare</i> | 0.03 |
| Papavero comune (CH) | <i>Papaver rhoeas</i> | 0.04 |
| Prunella comune (CH) | <i>Prunella vulgaris</i> | 0.09 |
| Salvia comune (CH) | <i>Salvia pratensis</i> | 0.65 |
| Salvastrella minore (CH) | <i>Sanguisorba minor</i> | 0.80 |
| Silene rigonfia (CH) | <i>Silene vulgaris</i> | 0.12 |
| Senape selvatica (CH) | <i>Sinapis arvensis</i> | 0.20 |
| Timo goniotrico (CH) | <i>Thymus pulegioides</i> | 0.20 |
| Trifoglio pratense (CH) | <i>Trifolium pratense</i> | 0.20 |
| Veccia delle siepi (CH) | <i>Vicia sepium</i> | 0.60 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|------|
| Strisce per organismi utili frutticoltura pluriennali | Paleo odoroso (CH) | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | 0.60 | |
| | Covetta dei prati (CH) | <i>Cynosurus cristatus</i> | 0.70 | |
| | Fienarola dei prati (CH) | <i>Poa pratensis</i> | 0.20 | |
| | Millefoglio montano (CH) | <i>Achillea millefolium</i> | 0.05 | |
| | Fiordaliso vero (CH) | <i>Centaurea cyanus</i> | 0.50 | |
| | Per la frutticoltura, le colture di bacche pluriennali e la permacultura | Fiordaliso stoppione(CH) | <i>Centaurea jacea</i> | 0.40 |
| | | Carota selvatica (CH) | <i>Daucus carota</i> | 0.20 |
| | | Grano saraceno comune | <i>Fagopyrum esculentum</i> | 6.00 |
| | | Caglio bianco (CH) | <i>Galium mollugo</i> | 0.08 |
| | | Geranio dei Pirenei (CH) | <i>Geranium pyrenaicum</i> | 0.30 |
| | | Costolina giuncolina (CH) | <i>Hypochaeris radicata</i> | 0.15 |
| | | Ambretta comune (CH) | <i>Knautia arvensis</i> | 1.00 |
| Cicerchia dei prati (CH) | | <i>Lathyrus pratensis</i> | 1.00 | |
| Dente di leone ramoso (CH) | | <i>Leontodon autumnalis</i> | 0.10 | |
| Margherita comune (CH) | | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 0.13 | |
| Ginestrino comune (CH) | | <i>Lotus corniculatus</i> | 0.50 | |
| Malva domestica (CH) | | <i>Malva neglecta</i> | 0.40 | |
| Camomilla comune (CH) | | <i>Matricaria chamomilla</i> | 0.02 | |
| Erba medica lupulina (CH) | | <i>Medicago lupulina</i> | 0.40 | |
| Meliloto bianco (CH) | | <i>Melilotus albus</i> | 0.15 | |
| Prunella comune (CH) | | <i>Prunella vulgaris</i> | 0.15 | |
| Senape selvatica (CH) | | <i>Sinapis arvensis</i> | 0.30 | |
| Trifoglio pratense (CH) | | <i>Trifolium pratense</i> | 0.30 | |
| Veccia delle siepi (CH) | <i>Vicia sepium</i> | 1.00 | | |

Osservazioni:

- Nelle Alpi centrali e sul versante sud delle Alpi¹ queste miscele non devono essere utilizzate (alterazione della flora autoctona)
- Le miscele vanno utilizzate nella zona di pianura e in quella collinare
- Vanno utilizzati ecotipi svizzeri (CH)

¹ UFAM (Ed.) 2022: *Die biogeografischen Regionen der Schweiz*. 1. aktualisierte Auflage 2022. Prima edizione 2001. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 pag.