



# Foglio illustrativo n. 6346 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	22.7 % Propiconazolo (250 g/l); 22.7 % Difenonazolo (250 g/l)
Denominazione IUPAC:	(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole; cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Difenonazolo + Propiconazolo

Numero di omologazione federale: D-6274	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 024111-00/008	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

### Taspa

Numero di omologazione federale: D-5293	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 024111-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Campicoltura</b>			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole, Ruggine delle barbabietole	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3
Frumento	Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4

Frumento	Bruciature fogliari (PLS)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 5, 6
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3

---

**Oneri generali / agronomici:**

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 3 Al massimo 1 trattamento.
- 4 Nelle zone minacciate da septoriosi e in caso di varietà sensibili.
- 5 In combinazione con Bravo 500 (1.5 l/ha).
- 6 All'apparizione dei primi sintomi sulle ultime tre foglie.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**

**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.