



Foglio illustrativo n. 7040 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	40 % Folpet ; 4.85 % Metalaxil-M
Denominazione IUPAC:	N-(trichloromethylthio)phthalimide; methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Ridomil Gold Combi Pepite

Numero di omologazione federale: A-5571	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2671/1	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Lampone	Marciume radicale del lampone	Concentrazione: 0.5 % Applicazione: Annaffiare., Prima della fioritura o dopo il raccolto	1, 2, 3, 4
Mora	Peronospora della mora	Concentrazione: 0.225 % Dosaggio: 2.25 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 2, 5, 6, 7
Viticultura			
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: Rossore parassitario	Concentrazione: 0.225 % Dosaggio: 3.6 kg/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro fine luglio., Irrorare.	2, 7, 8, 9, 10, 11

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

- 3 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG.
- 4 Nessuna applicazione direttamente prima di eventi piovosi e su terreni saturi d'acqua. Nessuna applicazione su terreni permeabili.
- 5 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 8 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- 9 Anche per applicazione per via aerea.
- 10 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 11 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 7 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

FraSI PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.