



# Foglio illustrativo n. 7050 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	9.1 % Mesotrione (100 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-(4-mesyloxy-2-nitrobenzoyloxy)cyclohexane-1,3-dione

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Callisto

Numero di omologazione federale: D-4669	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024660-00/021	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

### Callisto

Numero di omologazione federale: F-5108	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9900047	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro SAS, Francia

### Callisto

Numero di omologazione federale: D-4560	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4660-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

### Mesostar

Numero di omologazione federale: F-5546	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2150084	Titolare dell'autorizzazione estera: Life Sciences Ltd, Irlanda

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Orticoltura</b>			
Mais dolce	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.5 - 1.5 l/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 12-18).	1, 2, 3

**Campicoltura**

Mais

Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)

Dosaggio: 0.5 - 1.5 l/ha

1, 2

---

**Oneri generali / agronomici:**

- 1 Bassa dose d'applicazione utilizzabile unicamente in una miscela estemporanea secondo le indicazioni del titolare dell'autorizzazione.
- 3 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.