



Foglio illustrativo n. 7500 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 48 % Folpet ; 3.75 % Benalaxil-M
Denominazione IUPAC: N-(trichloromethylthio)phthalimide; methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Fantic F WG

Numero di omologazione federale: F-6004 Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2080063 Titolare dell'autorizzazione estera: Phyteurop S.A.,Francia

Fantic F

Numero di omologazione federale: D-5612 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 006260-00 Titolare dell'autorizzazione estera: Isagro S.p.A.,Italia

Fantic F WG

Numero di omologazione federale: I-5656 Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 12873 Titolare dell'autorizzazione estera: Isagro S.p.A.,Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
In generale	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: Rossore parassitario	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro fine luglio.	1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomichi:

- 1 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva e per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali.

- 2 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- 5 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-riferenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 4 Se entra in contatto con la pelle, il prodotto può provocare allergie. Durante la preparazione e l'applicazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione, indumenti protettivi e scarpe solide. Se è impossibile evitare che la pelle entri in contatto con il prodotto fitosanitario (p.es. con la sostanza nebulizzata o tramite il contatto con le piante trattate durante i lavori successivi), è necessario utilizzare ulteriore attrezzatura di protezione adeguata (p.es. visiera, copricapo). I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPo 2 Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.