



Foglio illustrativo n. 8009 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

| | |
|----------------------------|---|
| Denominazione specifica: | Fitoregolatore |
| Formulazione: | EC concentrato emulsionato |
| Tenore di principi attivi: | 17.5 % Trinexapac-etile (175 g/l) |
| Denominazione IUPAC: | ethyl 4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate |

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

| | |
|----------------------|---|
| Imballaggi: | Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia. |
| Residui di prodotto: | Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita. |

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

| Campo d'applicazione | Agente patogeno/Efficacia | Applicazione nel rispetto di | (*) |
|----------------------|---------------------------|---|-----|
| Campicoltura | | | |
| Avena | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.4 - 0.6 l/ha Applicazione: stadi 32-37 (BBCH). | 1 |
| Frumento autunnale | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.4 - 0.6 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 37 (BBCH). | 1 |
| Frumento primaverile | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.4 - 0.6 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 32 (BBCH). | 1 |
| Orzo autunnale | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.8 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 37 (BBCH). | 1 |
| Segale autunnale | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.4 - 0.6 l/ha Applicazione: stadi 32-37 (BBCH). | 1 |
| Spelta | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.4 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 37 (BBCH). | 1 |
| Triticale | Aumento della stabilità | Dosaggio: 0.6 - 0.8 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 37 (BBCH). | 1 |

Oneri generali / agronomici:

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.