



# Foglio illustrativo n. 8117 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EW emulsione, olio in acqua
Tenore di principi attivi:	6.7 % Fenossaprop-P-etile (69 g/l); Safener: 3.4 % Cloquintocet-mexyl (34.5 g/l)
Denominazione IUPAC:	(R)-2-[4-(6-chloro-2-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionate; 1-methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Campicoltura</b>			
Frumento autunnale, Spelta	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 - 1.2 l/ha Applicazione: Primavera, in post-emergenza., Stadi 13-31 (BBCH).	1, 2, 3
Frumento primaverile, Orzo autunnale, Orzo primaverile, Segale autunnale, Triticale	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 13-31 (BBCH). , Primavera, in post-emergenza.	1, 2, 3
<b>Coltivazione piante ornam.</b>			
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Tipi di miglio	Dosaggio: 0.4 - 1 l/ha Applicazione: Primo trattamento al più presto 6 settimane dopo l'emergenza, dopo il terzo taglio.	2, 4, 5, 6

### Oneri generali / agronomici:

- 1 Con l'aggiunta di 0.5l/ha Gondor (W 6326).
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 4 Non utilizzare in orti familiari.
- 5 Può danneggiare le Agrostidi (Agrostis).
- 6 Aspettare 7 a 10 giorni dopo l'applicazione prima di tosare il prato.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.